

Sommertriticale.

Amerischleben	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu Lager	Anfälligkeit für Mehltau	Anfälligkeit für Blattseptoria	Anfälligkeit für Gelbrost	Anfälligkeit für Braunrost	Anfälligkeit für Spelzenbräune	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	Tausendkorntmasse	Korntrag		
4	5	6	7	3	4	—	3	—	5	6	6	8		Dublet
													Vertrieb	Syngenta
													Standort	alle Standorte
													Saatzeit	so früh wie möglich
													Saatmenge	Frühsaat/günstig: 300–320 Kö/m ² Spätsaat/ungünstig: 330–350 Kö/m ²
6	6	5	6	2	5	—	5		5	5	6	6		Logo
													Vertrieb	BayWa Züchtervertrieb
													Standort	alle Standorte
													Saatzeit	Anfang Okt. bis Mitte Mär.
													Saatmenge	Frühsaat/günstig: 300 Kö/m ² optimaler Saattermin: 320 Kö/m ² Spätsaat/ungünstig: 340 Kö/m ²

Sommerweizen.

Amerischleben	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu Lager	Anfälligkeit für Mehltau	Anfälligkeit für Blattseptoria	Drechslerantrieb-roterbis	Anfälligkeit für Gelbrost	Anfälligkeit für Braunrost	Anfälligkeit für Anrenntsaatum	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	Tausendkorntmasse	Korntrag	Stufe 1	Stufe 2			
4	4	4	3	2	4	5	—	2	5	—	8	2	7	6	—		E-Weizen	SW Kadrij
																Vertrieb	Lantmännen SW Seed	
																Standort	alle Anbauanlagen (Wechsel-/Sommerweizeneignung)	
																Saatzeit	Mitte Nov. bis Apr.	
																Saatmenge	Okt. bis Anfang Nov.: 350–400 Kö/m ² bis spät Anfang Mär.: 400–500 Kö/m ²	
3	4	3	6	4	4	4	—	6	5	4	5	5	7	5	6		E-Weizen	Taifun
																Vertrieb	KWS Lochow	
																Standort	alle Anbauanlagen (Wechsel-/Sommerweizeneignung)	
																Saatzeit	Mitte Nov., im Frühjahr, bis Mitte Apr.	
																Saatmenge	am Mitte Nov.: 350–420 Kö/m ² Feb. bis Mitte Mär.: 350–400 Kö/m ² Mitte Mär. bis Mitte Apr.: 400–480 Kö/m ²	
5	5	5	4	5	5	5	—	6	4	—	7	4	5	5	—		E-Weizen	Triso
																Vertrieb	I. G. Pflanzenzucht	
																Standort	alle Anbauanlagen (Wechsel-/Sommerweizeneignung)	
																Saatzeit	Ende Nov. bis Apr.	
																Saatmenge	380–450 Kö/m ²	
6	6	2	4	1	5	5	—	2	6	—	5	5	8	7	—		A-Weizen	Tybolt
																Vertrieb	Saaten-Union	
																Standort	ertragsortiert intensiven Anbau auf besseren Böden	
																Saatzeit	Dez. bis Mitte Apr.	
																Saatmenge	extreme Frühsaat (Dez.): 400–430 Kö/m ² Anfang Mär. bis Mitte Apr.: 370–400 Kö/m ²	