Sonnenblumen.

Blühbeginn	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu Lager	Anfälligkeit für Botrytis	Anfälligkeit für Sclerotinia	Tausenkornmasse	Kornertrag	Ölertrag	Ölgehalt		
3	4	5	3	4	4	5	6	6	5		**Alisson**
										Vertrieb	Euralis
										Standort	alle Standorte, besonders leichte Trockenstandorte
										Saatzeit	bei 8 °C Bodentemperatur, ab ca. 10. Apr.
										Saatmenge	ca. 7–9 Pflanzen je m²
3	5	5	3	4	4	9	9	5	—	NEU!	**DKF 2824** ***(Züchtereinstufung)***
										Vertrieb	Syngenta
										Standort	alle typischen Standorte
										Saatzeit	Apr. (6–8 °C Bodentemperatur), kein Frost
										Saatmenge	ca. 7 Pflanzen je m²
3	4	5	3	4	4	6	6	7	6		**ES Aloha**
										Vertrieb	Euralis
										Standort	alle Standorte, auch leichte
										Saatzeit	bei 8 °C Bodentemperatur, ab ca. 10. Apr.
										Saatmenge	7–9 Pflanzen je m²
3	4	3	3	4	—	5	6	7	5		**ES Biba**
										Vertrieb	Euralis
										Standort	alle Standorte, auch leichte
										Saatzeit	bei 8 °C Bodentemperatur, ab ca. 10. Apr.
										Saatmenge	7–9 Pflanzen je m²
3	4	4	2	—	3	4	8	7	4	Vogelfutter	**ES Carneval**
										Vertrieb	Euralis
										Standort	alle Standorte, auch leichte
										Saatzeit	bei 8 °C Bodentemperatur, ab ca. 10. Apr.
										Saatmenge	7–9 Pflanzen je m²
3	5	5	3	3	3	6	6	6	4		**ES Magnific**
										Vertrieb	Euralis
										Standort	alle Standorte, auch leichte
										Saatzeit	bei 8 °C Bodentemperatur, ab ca. 10. Apr.
										Saatmenge	7–9 Pflanzen je m²
3	5	4	2	4	3	5	7	6	4	Vogelfutter	**ES Royal**
										Vertrieb	Euralis
										Standort	alle Standorte, auch leichte
										Saatzeit	bei 8 °C Bodentemperatur, ab ca. 10. Apr.
										Saatmenge	7–9 Pflanzen je m²
3	5	5	2	4	4	6	7	4	—		**Extrasol (HO)**
										Vertrieb	Syngenta
										Standort	alle typischen Standorte
										Saatzeit	Apr. (6–8 °C Bodentemperatur), kein Frost
										Saatmenge	ca. 7 Pflanzen je m²
3	4	5	2	4	4	6	6	7	7		**LG 54.24**
										Vertrieb	Limagrain
										Standort	frühreife Sorte, alle Standorte
										Saatzeit	Apr. bis Mai
										Saatmenge	6–7 Pflanzen je m²

Blühbeginn	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu Lager	Anfälligkeit für Botrytis	Anfälligkeit für Sclerotinia	Tausenkornmasse	Kornertrag	Ölertrag	Ölgehalt		
4	4	5	1	4	4	9	9	5	—		**NK Delfi**
										Vertrieb	Syngenta
										Standort	alle typischen Standorte
										Saatzeit	Apr. (6–8 °C Bodentemperatur), kein Frost
										Saatmenge	ca. 7 Pflanzen je m²
3	5	3	1	4	4	8	9	6	—	NEU!	**NK Dolbi** ***(Züchtereinstufung)***
										Vertrieb	Syngenta
										Standort	alle typischen Standorte
										Saatzeit	Apr. (6–8 °C Bodentemperatur), kein Frost
										Saatmenge	ca. 7 Pflanzen je m²
3	4	5	2	4	4	7	7	4	—		**NK Singi**
										Vertrieb	Syngenta
										Standort	alle typischen Standorte
										Saatzeit	Apr. (6–8 °C Bodentemperatur), kein Frost
										Saatmenge	ca. 7 Pflanzen je m²
3	5	4	3	4	4	6	7	5	—		**Pegasol**
										Vertrieb	Syngenta
										Standort	alle typischen Standorte
										Saatzeit	Apr. (6–8 °C Bodentemperatur), kein Frost
										Saatmenge	ca. 7 Pflanzen je m²
3	4	4	3	4	4	6	6	4	—		**Rigasol**
										Vertrieb	Syngenta
										Standort	alle typischen Standorte
										Saatzeit	Apr. (6–8 °C Bodentemperatur), kein Frost
										Saatmenge	ca. 7 Pflanzen je m²

Blühbeginn	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu Lager	Anfälligkeit für Botrytis	Anfälligkeit für Sclerotinia	Gesamtgrünmasse	Gesamttrockenmasse		
4	5	5	3	3	5	5	5		**ES Electra**
								Vertrieb	Euralis
								Standort	alle Standorte
								Saatzeit	bei 8 °C Bodentemperatur, ab ca. 10. Apr.
								Saatmenge	ca. 8–9 Pflanzen je m²

Märka Produktkatalog 2010/2011