

Äverschieben	Reife	Plantenzlänge	Neigung zu Auswinterung	Neigung zu Lager	Anfälligkeit für Mehltau	Anfälligkeit für Blattsepiebrä	Anfälligkeit für Gelbrost	Bestandestichte	Kornzahl/Ähre	Tausendkorngewicht	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2			
5	5	3	4	2	1	4	—	1	—	6	6	7	8	<b>Agostino</b>	
														Vertrieb	Lantmännen SW Seed
														Standort	alle Standorte
														Saatzeit	Mitte Sep. bis Mitte Okt.
														Saatmenge	Normalsaat: 250–330 Kö/m <sup>2</sup> Spätsaat: 330–380 Kö/m <sup>2</sup>
4	4	8	5*	5	3	4	—	1	—	5	7	7	9	<b>Cosinus (*Züchtereinstufung)</b>	
														Vertrieb	KWS Lochow
														Standort	alle Standorte
														Saatzeit	Mitte Sep. bis Anfang Nov.
														Saatmenge	Frühsaat: 240–270 Kö/m <sup>2</sup> Normalsaat: 270–300 Kö/m <sup>2</sup> Spätsaat: 330–350 Kö/m <sup>2</sup>
6	5	2	4	2	1	4	—	2	5	6	8	4	8	<b>Grenado</b>	
														Vertrieb	Syngenta
														Standort	alle Standorte
														Saatzeit	Mitte Sep. bis Anfang Nov.
														Saatmenge	Frühsaat/günstig: 250–280 Kö/m <sup>2</sup> Spätsaat/ungünstig: 310–350 Kö/m <sup>2</sup>
5	5	7	—	7	1	4	—	2	—	5	8	5	7	<b>Moderato</b>	
														Vertrieb	Syngenta
														Standort	alle Standorte
														Saatzeit	Mitte Sep. bis Anfang Nov.
														Saatmenge	Frühsaat/günstig: 270–300 Kö/m <sup>2</sup> Spätsaat/ungünstig: 310–350 Kö/m <sup>2</sup>
6	5	4	—	2	1	4	—	3	—	5	6	8	8	<b>Sequenz</b>	
														Vertrieb	BayWa Züchtervertrieb
														Standort	alle Anbauregionen
														Saatzeit	früh bis spät
														Saatmenge	Normalsaat: 250–300 Kö/m <sup>2</sup> Spätsaat: 300–370 Kö/m <sup>2</sup>
5	5	3	4	3	2	5	4	4	4	5	6	9	7	<b>SW Talentro</b>	
														Vertrieb	Lantmännen SW Seed
														Standort	alle Standorte
														Saatzeit	Mitte Sep. bis Mitte Okt.
														Saatmenge	Normalsaat: 250–330 Kö/m <sup>2</sup> Spätsaat: 330–380 Kö/m <sup>2</sup>
4	5	8	—	5	2	5	—	3	—	4	8	7	9	<b>Tarzan</b>	
														Vertrieb	I. G. Pflanzenzucht
														Standort	alle Standorte
														Saatzeit	Ende Sep. bis Anfang Okt.
														Saatmenge	Normalsaat: 250–280 Kö/m <sup>2</sup> Spätsaat: 280–320 Kö/m <sup>2</sup> sehr leichte Triticalestandorte: 220–250 Kö/m <sup>2</sup>
4	5	8	—	5	2	5	—	3	—	4	8	7	9	<b>Vitalis</b>	
														Vertrieb	I. G. Pflanzenzucht
														Standort	sehr gute Eignung für leichte Standorte
														Saatzeit	Mitte bis Ende Sep., evtl. Okt.
														Saatmenge	Normalsaat: 250–280 Kö/m <sup>2</sup> Spätsaat: 280–330 Kö/m <sup>2</sup>